



Лауреат конкурсов

«100 лучших товаров России»



**ВИТАСОЛЬ**  
VITASOL

Более 20 лет на российском и зарубежном рынках

Тел. **8-800-707-2852**

8 (48438) 294-00 / 01 / 07

249013, Калужская обл., Боровский р-н,  
г. Боровск, п. Институт, д. 16

E-mail: [vitasol@borovsk.ru](mailto:vitasol@borovsk.ru)

<http://www.vitasol.ru>

## ПРЕМИКСЫ • КОМБИКОРМА-СТАРТЕРЫ • КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

### Премиksы

антикетозные,  
качество мяса,  
плодовитости,  
животных

### специального

антистрессовые,  
молока и яйца,  
продуктивности и

### назначения:

улучшающие,  
способствующие  
и сохранности

### Витамины,

аминокислоты,  
минеральные элементы и другие  
компоненты для производства  
премиksов и комбикормов



- Актуальные исследования и разработка новых продуктов
- Разработка индивидуальных программ кормления
- Научно-техническое сопровождение клиентов, ориентированное на отладку эффективной и экономически выгодной системы кормления
- Культура качества и цены
- Аккредитованная лаборатория, экспресс-анализ кормов
- Лицензионное производство лекарственных средств для животных
- Наличие автопарка и гостиницы

РЕКЛАМА



**PECUS INTERNATIONAL A/S — КОМПАНИЯ-ЭКСПОРТЕР,  
ПОСТАВЛЯЮЩАЯ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ  
МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ДАНИИ.**



**PECUS INTERNATIONAL A/S**

МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д. 29, ОФИС 1404А

ТЕЛ.: +7 (499) 133-22-81, +7 (917) 599-71-94

[WWW.PECUS.RU](http://WWW.PECUS.RU) [INFO@PECUS.RU](mailto:INFO@PECUS.RU)

РЕКЛАМА

# Растим высокоудойную корову

Надежда АЛМАЗОВА  
ООО «Порк-Экс»

**В любом молочном хозяйстве расходы, связанные с выращиванием телок, приобретением корма и оплатой труда персонала, – основные затраты. Их уровень порой очень сложно заранее рассчитать и контролировать. В то же время сельхозпроизводитель хочет получить телок, которые станут высокопродуктивными молочными коровами. Это позволит увеличить надой уже при первой лактации.**



**Н**еобходимость вложения сил, умений и средств в развитие телок зачастую недооценивают, так как инвестиции окупятся намного позже.

Несомненно, телки должны стать стельными коровами, войти в стадо в оптимальном возрасте, обладать хорошим здоровьем и сопротивляемостью к различным болезням, сохранять и развивать генетически заложенную молочную продуктивность. Безусловно, в достижении этих целей ведущую роль играет грамотное кормление, однако не менее важны и такие составляющие, как менеджмент и ежедневный уход.

Необходимо постоянно контролировать привесы телок. Не рекомендуется осеменять их раньше, чем они достигнут живой массы 200 кг (норма для джерсейской породы) и 300 кг (норма для голштинской породы), что зачастую происходит в возрасте 13–15 месяцев, позже наступления первой половой охоты. Животные, которые при осеменении имеют недостаточный вес, не успевают набрать нужную массу до отела. Это может привести к тяжелым родам и стать причиной низких надоев.

Прирост живой массы телок необходимо контролировать на всех этапах их жизни. Если нет возможности ре-

гулярно взвешивать животных, их вес рассчитывают по такому параметру, как обхват груди (его измеряют с помощью специальной ленты).

Доказано, что период с 3 до 13 месяцев — критический в жизни телок всех пород. Поскольку в это время формируются ткани вымени, привесы нужно контролировать строже. Нельзя допускать, чтобы среднесуточные приросты живой массы нетелей джерсейской породы превышали 500 г, а голштинской — 700 г. Животных не следует вволю кормить концентратами. Лишний вес будет означать то, что в вымени вместо альвеол образуется жировая ткань. Отрицательное последствие этого явления — низкая молочность в течение всей жизни коровы.

По окончании критического периода приросты живой массы должны постепенно увеличиваться и варьировать в пределах 550–800 г в сутки, чтобы животное набирало оптимальный для отела вес. При подготовке к отелу нетелей в возрасте 22–24 месяцев приучают к потреблению большого количества корма, содержащего много энергии (для обеспечения высоких надоев в первую лактацию), поэтому среднесуточные приросты на этом этапе выращивания должны составлять 860–1360 г.

На молочную продуктивность влияет и уровень адаптации животного к окружающей среде, к условиям содержания и кормления на момент отела. Вот почему за 1–2 месяца до родов телок размещают вместе с коровами. За это время нетели привыкают к потреблению рационов, которые получают высокопродуктивные коровы, и приспособляются к новой системе содержания (поведение в группе определяется ранговым местом животных в социальной иерархии в результате доминирования старших над младшими). Нетелей нужно несколько раз привести в доильный зал, чтобы в будущем избежать технологического стресса у первотелок.

Выполнение этих простых правил и грамотное управление стадом (контроль живой массы, среднесуточных привесов, состояния здоровья и др.) дает возможность принимать верные решения, позволяет при оптимальных затратах вырастить высокоудойных коров и долгое время поддерживать их молочную продуктивность на высоком уровне.

ЖР

ООО «Порк-Экс»  
119331, Москва,  
пр-т Вернадского, д. 29, офис 1404А  
E-mail: info@porc-ex.ru  
www.porc-ex.ru