

Холодовой стресс у телят: сохраняем привесы в осенне-зимний период

Михаил ЛУГОВОЙ,

независимый консультант по кормлению сельскохозяйственных животных, кандидат биологических наук

Осенне-зимний период — время повышенного риска для телят молочного периода выращивания. Холод, сырость, сквозняки и резкие изменения погоды вынуждают организм расходовать энергию корма не на рост, а на поддержание температуры тела. В результате снижаются привесы, ослабевает иммунитет, растет заболеваемость. Разберем, как распознать холодовой стресс, чем он опасен, и как путем правильного содержания и кормления, в том числе с использованием заменителя цельного молока (ЗЦМ), сохранить здоровье и продуктивность телят.

При какой температуре теленка мерзнут?

У каждого животного есть зона термонейтральности — диапазон температуры воздуха, при которой организм, получающий полноценное питание, может поддерживать нормальную температуру тела без выраженных защитных реакций на холод или жару — таких, как дрожь, учащенное дыхание и расщепление жировой ткани. Нижняя граница этой зоны называется нижней критической температурой. У теленка она значительно выше, чем у взрослой коровы: в возрасте до трех недель — около $+15...+20^{\circ}\text{C}$, старше трех недель — около $+10^{\circ}\text{C}$. По мере роста живой массы, накопления подкожного жира и развития рубца, в котором в процессе микробной ферментации корма выделяется много тепла, устойчивость к холоду повышается.

Важно учитывать, что теленок ощущает не ту температуру, которую показывает термометр. Сквозняк, влажная подстилка, мокрая шерсть, контакт с холодным полом многократно усиливают теплопотери. Поэтому холодовой стресс может развиваться и в зоне термонейтральности, например, осенью в сырую ветреную погоду.

О том, что теленок мерзнет, говорят следующие признаки:

- мышечная дрожь, особенно в состоянии покоя;
- сгорбленная поза, поджатые конечности, стремление лечь, свернувшись, и зарыться в подстилку;
- взъерошенная, поднятая шерсть, иней на шерсти;
- холодные на ощупь уши, губы, конечности;
- вялость, ослабление сосательного рефлекса, неспособность выпить норму молочного корма, снижение поедаемости стартера;
- ректальная температура ниже $38,5^{\circ}\text{C}$ (норма для теленка — $38,5-39,5^{\circ}\text{C}$).

Если теленок худеет, у него впалые бока и тусклая шерсть, — это признаки затяжного дефицита энергии, которые уже отразились на росте.

Как холод влияет на организм теленка?

Теленок рождается с минимальными энергетическими резервами: подкожный жир составляет лишь 2–4% массы тела, а запасов бурой жировой ткани и гликогена хватает ненадолго. При этом из-за невысокой массы и относительно большой площади по-

верхности тела теленок быстро теряет тепло.

На холоде включаются механизмы терморегуляции, требующие энергии, которую теленок в начале молочного периода получает почти исключительно с жидким кормом. Если ее недостаточно, организм мобилизует собственные резервы — жир и мышечный белок — и рост останавливается.

Длительный холодовой стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Повышение уровня кортизола угнетает фагоцитоз и выработку антител, вызывая иммуносупрессию. Холодный влажный воздух нарушает работу мерцательного эпителия дыхательных путей, открывая дорогу возбудителям респираторных инфекций. У новорожденных телят, переохладившихся в первые часы жизни, ослабевает сосательный рефлекс, они позже и в меньшем объеме получают молозиво, поэтому возрастает риск недостаточной передачи пассивного иммунитета (Миронов А.Н., Плешков В.А., Зубова Т.В., 2022; Фёдоров Ю.Н., Клюкина В.И., Богомолова О.А., Романенко М.Н., 2018).

Чем опасен холодовой стресс?

Осенью и зимой ветеринарные специалисты чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:

- *Респираторные болезни (бронхопневмонии).* Их провоцируют резкие перепады температуры, высокая влажность, сквозняки, накопление аммиака в помещениях с недостаточной вентиляцией и высокая плотность размещения поголовья.
- *Неонатальные диареи.* Холод усугубляет энергодифицит и обезвоживание, а больной теленок переохлаж-

дается быстрее. Ротавирусы, коронавирусы и криптоспоридии обладают высокой выживаемостью в сырой холодной среде.

- **Недостаточная передача колостральных иммуноглобулинов.** Телята, родившиеся в условиях холодового стресса, выпивают естественным образом (без дренчера) меньше молозива, так как позже встают и дольше не проявляют сосательного рефлекса. Между тем молозиво жизненно необходимо теленку в первый час после рождения. Уже через шесть часов после отела эффективность всасывания иммуноглобулинов снижается примерно вдвое, а при концентрации IgG в сыворотке крови ниже 10 мг/мл резко возрастает риск гибели телят (Миронов А.Н., Плешков В.А., Зубова Т.В., 2022; Фёдоров Ю.Н., Ключкина В.И., Богомолова О.А., Романенко М.Н., 2018).
- **Гипотермия и гипогликемия новорожденных,** особенно при отелах в неотапливаемых помещениях.
- **Омфалиты и обморожения.** Влажная, плохо обработанная пуповина в холодном помещении, — входные ворота для пупочного сепсиса. При сильных морозах возможны обморожения ушей, хвоста, конечностей.

К чему приводит переохлаждение телят?

Прежде всего, холодовой стресс приводит к снижению среднесуточных приростов. Если энергия рациона покрывает только потребность в поддержании жизни, теленок перестает расти, даже если его кормят «по норме». Ухудшается конверсия корма: возрастают затраты жидкого корма и престартера на килограмм прироста. Ослабленные телята хуже поедают сухой корм, что замедляет развитие рубца и осложняет отъем.

Отставание в росте в молочный период трудно компенсировать. Из-за этого увеличивается возраст первого осеменения и отела. Телки, перенесшие респираторные болезни в раннем возрасте, как правило, позже телятся, чаще выбывают из стада, а их продуктивность в первую лактацию ниже, чем у не болевших сверстниц.

Экономический ущерб складывается из прямых затрат (на ветеринарные препараты и оплату труда), убытков от падежа, а также косвенных потерь: не-

дополученного прироста, удлинения периода выращивания ремонтных телок и снижения их будущей молочной продуктивности. Каждый дополнительный месяц выращивания до первого отела — это дополнительные расходы на корма и уход.

Как организовать содержание телят в холодное время?

Сам по себе холод не так опасен для теленка, как сырость, сквозняки и недостаток энергии в рационе. Исследования, проведенные в разных климатических условиях, в том числе в резко континентальном климате, показывают, что технологическая схема и условия содержания существенно влияют на рост и сохранность телят (Сайлаубек П.Ж., Сивкин Н.В., Байсбырова А.А., 2022; Хорошайло Т.А., Козубов А.С., Ким П.В., 2023). Основные правила следующие.

- **Сухая глубокая подстилка.** Это один из важнейших факторов предотвращения холодового стресса. Лучшее всего подходит длинная солома: лежащий теленок должен зарываться в нее так, чтобы конечности были полностью скрыты (так называемый «эффект гнезда», Nesting Score 3). Свежую солому подсыпают ежедневно для изоляции влаги и консервации нижнего теплового слоя. Визуально влажность можно оценить по наличию мокрых пятен. Инструментальный метод применяют выборочно для замера влажности в боксах с помощью портативного штыревого влагомера. Допустимый уровень влажности соломы в зоне отдыха теленка — не более 20%. Превышение этого показателя требует немедленного увеличения нормы внесения сухой подстилки.
- **Защита от сквозняков при сохранении воздухообмена.** Скорость движения воздуха на уровне лежащего теленка не должна превышать 0,2–0,3 м/с. При этом полностью перекрывать вентиляцию нельзя: концентрация аммиака не должна быть выше 10–20 ppm, относительная влажность воздуха — выше 80%.
- **Правильное размещение домиков.** Индивидуальные домики устанавливают на возвышенном дренированном месте открытой стороной к югу или в сторону, противоположную преобладающим ветрам. Используют ветро-

защитные экраны, прикрывают задние вентиляционные окна.

- **Утепляющие попоны.** Их используют для телят до 3–4-недельного возраста при температуре ниже +10 °С. Попону надевают только на сухого теленка и следят, чтобы она не намокала.
- **Молозивное кормление.** Новорожденного обсушивают, обрабатывают пуповину и в первые 1–2 часа выпаивают качественное молозиво, подогретое до 38–39 °С, в объеме 10% от массы тела.
- **Санитария.** Соблюдают принцип «пусто — занято», проводят мойку, дезинфекцию и просушку домиков и секций перед заселением.
- **Ежедневный мониторинг.** Контролируют поведение, аппетит, поедаемость престартера, при подозрении на болезнь измеряют ректальную температуру.

Что делать при сильном переохлаждении теленка?

Снижение ректальной температуры до 38 °С свидетельствует о переохлаждении, ниже 37 °С — о тяжелой гипотермии, угрожающей жизни. В таких случаях необходимо действовать быстро:

- перенести теленка в теплое помещение (+20...+25 °С) без сквозняков;
- обсушить и растереть тело соломенным жгутом или полотенцем, чтобы стимулировать кровообращение;
- постепенно согревать теленка в теплой ванне при температуре воды 38–40 °С (голова должна находиться над водой), после чего тщательно высушить и перевести на сухую глубокую подстилку;
- при сохраненном сосательном рефлексе выпоить теплый (38–40 °С) молочный корм или раствор глюкозы с электролитами. Если рефлекс отсутствует, традиционное выпаивание из соски запрещено из-за риска аспирации. В этом случае питание и регидратационные растворы вводят принудительно через пищеводный зонд (дренчер);
- измерять температуру каждые 30 минут до ее стабилизации на уровне 38,5–39,5 °С. Сразу после завершения активного согревания надеть попону, вернуть теленка на сухую глубокую подстилку и наблюдать за ним в течение нескольких дней, так как после переохлаждения высок риск развития пневмонии и диареи.



Как кормить телят в осенне-зимний период?

В холодные месяцы возрастает потребность телят в обменной энергии. Потребность в протеине, витаминах и минеральных веществах, необходимых для роста, сохраняется, поэтому дополнительную энергию нужно обеспечить, не нарушая баланс рациона. Кроме того, зимой важно поддерживать иммунитет: следить за обеспеченностью телят витаминами А, D, Е, селеном, цинком. Исследования, проведенные в зимний период, подтверждают, что балансирование рациона по минеральным веществам помогает повысить сохранность и скорость выращивания телят (Кердяшов Н. Н., Дарьин А. И., Овчинников А. В., 2020).

С третьего-четвертого дня жизни у теленка должен быть свободный доступ к сухому престартеру, а со второго дня — к чистой теплой воде. Впоследствии ферментация углеводов престартера в рубце станет для организма внутренним источником тепла. Чем раньше теленок начнет поедать сухой корм, тем быстрее разовьется его рубцовое пищеварение и тем легче он будет переносить холодовой стресс.

Как удовлетворить потребность телят в энергии?

Согласно нормам Национального исследовательского совета США (National Research Council, NRC), если температура ниже критической, потребность телят в обменной энергии на поддержание жизни увеличивается в соответствии с показателями, представленными в таблице.

Увеличение потребности телят в обменной энергии на поддержание жизни, %		
Температура воздуха, °С	Возраст телят	
	до трех недель	старше трех недель
+15	13	—
+10	27	—
+5	40	13
0	54	27
–10	81	54
–20	108	81

Например, теленку массой 45 кг в комфортных условиях для поддержания жизни требуется около 7,3 МДж обменной энергии в сутки, что соответствует примерно 2,6 л цельного молока. При температуре –10 °С потребность воз-

растает до 13 МДж, или 4,7 л молока, и это без учета энергии на прирост. Чтобы теленок продолжал прибавлять в весе 500–600 г в день, ему потребуется около 7 л молока в сутки.

Это не означает, что телят можно содержать вне зоны термонейтральности. Указанные в таблице показатели для критически низких температур (до –20 °С) приведены исключительно как ориентиры для экстренной коррекции рациона (например, при аварии в системе отопления) и для оценки тяжести метаболических нарушений при холодовом стрессе.

Выпаивать повышенный суточный объем корма за два приема нельзя. Объем сычуга у теленка первых недель жизни ограничен. При чрезмерной разовой нагрузке излишки молочного корма неизбежно перетекают в неразвитый рубец, где подвергаются гнилобродному брожению, вызывая острые расстройства пищеварения.

В холодный период повышать общую калорийность рациона при фиксированном составе молочного корма рекомендуется за счет введения промежуточных кормлений. Переход на трехкратную выпойку — значительно более физиологичный и безопасный способ предотвращения холодового стресса, чем увеличение разовой порции.

Если на ферме используют цельное молоко, важно учитывать, что его состав нестабилен, оно быстро остывает на холоде и может служить источником инфекций. Кроме того, рост объемов выпойки снижает количество товарного молока. По этой причине в условиях промышленного комплекса эффективнее повышать не физический объем порций, а энергетическую плотность жидкого корма (путем обогащения или использования высококачественного ЗЦМ), заранее предусмотрев в технологической карте вариативную кратность кормления по мере снижения температуры.

Почему в холодное время теленку нужен ЗЦМ?

Выпойка телят ЗЦМ вместо цельного молока в холодное время имеет ряд важных преимуществ.

- **Экстренная компенсация энергодефицита.** ЗЦМ позволяет гибко управлять плотностью рациона. Повысив концентрацию сухого вещества (СВ) в готовом молочном корме с 12,5 до

15%, можно увеличить поступление обменной энергии в организм теленка на 20% без критического увеличения физического объема порции. В качестве альтернативы на крупных фермах применяют метод зимнего обогащения цельного молока: добавление сухого ЗЦМ в количестве 25 г на 1 л позволяет поднять уровень СВ до целевых 15%.

- **Биобезопасность.** Зимой естественная резистентность молодняка падает из-за холодового стресса. Использование биологически чистого ЗЦМ полностью исключает передачу патогенов и остатков антибиотиков, которые часто присутствуют в сборном непастеризованном молоке. За счет этого организму теленка не приходится расходовать антитела на борьбу с алиментарной инфекцией и он сохраняет иммунные ресурсы для защиты от респираторных заболеваний.
 - **Контроль температуры.** Зимой жидкий корм остывает в разы быстрее, а выпаивание холодного молока гарантированно приводит к диарее и падению температуры тела. Сухой ЗЦМ разводят непосредственно перед раздачей в теплой воде со стабильными параметрами, что позволяет строго выдерживать технологический стандарт (+39...+40 °С) при разливе по поилкам.
 - **Технологическая адаптивность при резких заморозках.** В отличие от цельного молока, объемы которого ограничены суточным удоем, запасы сухого ЗЦМ позволяют зоотехнической службе мгновенно реагировать на температурные колебания: оперативно вводить дополнительные внеплановые выпойки, корректировать их объемы по группам и точно рассчитывать рацион без риска дефицита корма.
 - **Стабильность питательных веществ на фоне зимней смены рационов.** Качество и жирность цельного молока в зимне-стойловый период могут колебаться из-за нестабильного качества силоса или сенажа. ЗЦМ гарантирует постоянный профиль легкоусвояемых жиров, аминокислот, витаминов (А, D, Е) и микроэлементов, необходимых для терморегуляции.
- Эффективность ЗЦМ в зимний период подтверждена исследованиями.

Результаты опыта В.Ф. Радчикова и соавторов доказывают, что использование ЗЦМ позволяет поддерживать высокую энергию роста молодняка на уровне, достигаемом при применении цельного молока. Среднесуточный прирост телят, получавших ЗЦМ, составил 693 г против 709 г в группе животных, получавших цельное молоко (разница статистически недостоверна), при этом стоимость рациона снизилась на 6%, а себестоимость 1 кг прироста живой массы — на 3,6% (Радчиков В.Ф., Радько М.Е., Приловская Е.И. и др., 2020).

В исследовании А.И. Дедковой и Н.Н. Сергеевой, проведенном в самый суровый климатический период (январь — март), телята, которым выпаивали ЗЦМ с 21-го по 27-й день жизни, по показателям общего развития не уступали животным контрольной группы, получавшим цельное молоко. В одной из опытных групп среднесуточный прирост превысил показатель контрольной группы на 2% (Дедкова А.И., Сергеева Н.Н., 2024).

В чем отличия ЗЦМ для осенне-зимнего периода?

В холодное время года жидкий молочный корм должен обладать повышенной энергетической ценностью при сохранении оптимального соотношения энергии и протеина. Качественный зимний ЗЦМ имеет следующие параметры.

- **Сырой жир** — 18–22% (достаточный для летнего периода уровень — 15–18%). Жир высвобождает в 2,25 раза больше энергии, чем углеводы. Для полного усвоения он должен быть хорошо эмульгирован и представлять собой мелкодисперсные шарики.
- **Сырой протеин** — 20–24%, преимущественно молочного происхождения (сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, концентраты сывороточных белков).
- **Лактоза** — около 40% (основной и самый доступный источник углеводов). Крахмала в составе быть не должно, содержание сырой клетчатки — минимальное.
- **Витамины и минеральные вещества:** А, D₃, Е, селен, цинк, медь, железо (предпочтительно в хелатной форме).
- **Функциональные компоненты:** пробиотики, органические кислоты.

При повышении концентрации смеси в зимний период необходимо кон-

тролировать ее осмолярность: она не должна превышать 400–500 мОсм/л, иначе возрастает риск осмотической диареи.

Как организовать выпойку при низких температурах?

При организации выпойки в осенне-зимний период необходимо руководствоваться следующими принципами.

- **Увеличение кратности кормления.** При температуре ниже 0 °С целесообразно перейти с двукратной на трехкратную выпойку с равными интервалами.
- **Постепенное повышение питательности.** Энергетическую ценность суточного рациона увеличивают путем повышения концентрации СВ в ЗЦМ (например, со 125 до 150 г на 1 л готового корма) и введением дополнительной выпойки.
- **Соблюдение температурного режима.** Сухой ЗЦМ восстанавливают в воде температурой 45–55 °С, а выпаивают при температуре 39–40 °С. В морозные дни жидкий корм быстро остывает, поэтому его готовят непосредственно перед раздачей, доставляют к домикам в термоизолированных емкостях или с помощью «молочного такси» с функцией постоянного подогрева.
- **Поддержание гигиены.** Поилки, ведра и соски после каждого кормления моют горячей водой и высушивают. Остатки корма удаляют, не допуская их замерзания. Важно: во избежание распространения инфекций выпойку всегда начинают с самых молодых и здоровых животных, а ослабленных выпаивают в последнюю очередь.
- **Поение водой.** Чистую умеренно теплую воду предлагают телятам между кормлениями (не ранее чем через 40–60 минут после выпойки ЗЦМ), чтобы не нарушать процесс сычужного створоживания. Воду в ведрах необходимо регулярно обновлять, а остатки убирать до момента замерзания. Потребление холодной воды зимой приводит к критическим потерям тепловой энергии.
- **Бережный отъем.** Не рекомендуется проводить отъем и перегруппировку в сильный мороз. Снятие теленка с выпойки допустимо только тогда, когда он стабильно съедает не менее 1,5 кг сухого стартерного корма в сутки на протяжении трех дней подряд.

Что дает правильное кормление и содержание телят в холодные месяцы?

Экономический эффект при правильном содержании телят в осенне-зимний период складывается из нескольких составляющих. Во-первых, повышается сохранность поголовья и снижаются затраты на лечение. Во-вторых, телята достигают запланированных приростов, благодаря чему ремонтные телки своевременно набирают массу, необходимую для первого осеменения. Это оптимизирует возраст первого отела и снижает общие затраты на выращивание молодняка. В-третьих, использование качественного ЗЦМ позволяет направить товарное молоко на реализацию. Например, если в зимний сезон выращивать 100 телят и выпаивать каждому по 6 л цельного молока в сутки в течение 60 дней, потребуется около 36 т молока, которое при переходе на ЗЦМ можно реализовать. При этом, как подтверждают исследования, себестоимость 1 кг прироста живой массы при выпойке ЗЦМ ниже, чем при использовании цельного молока (Радчиков В.Ф., Радько М.Е., Приловская Е.И. и др., 2020).

Таким образом, прямые инвестиции в профилактику холодового стресса многократно ниже тех скрытых и явных убытков, которые предприятие несет от падежа, вынужденной выбраковки и необратимого отставания животных в росте. Сухая глубокая подстилка, хорошая вентиляция без сквозняков, строгое соблюдение протокола кормления в первые часы для формирования сильного колышального иммунитета, повышение калорийности рациона за счет ЗЦМ, переход на трехкратную выпойку и непрерывный мониторинг состояния животных — вот основа, которая позволяет сохранить здоровье молодняка и плановые среднесуточные приросты в осенне-зимний период, а также заложить фундамент высокой молочной продуктивности будущих коров. **ЖР**



ГК «РУСАГРО»
115054, Москва, ул. Валовая, д. 35
NUTRILACTPRO
Тел.: +7 (999) 556-96-01
Эл. почта:
nutrilactpro@rusagromaslo.com
<https://nutrilactpro.ru>